






A retenir

MILDIU	Pression en baisse. Maintenez la surveillance.
OÏDIUM	Restez vigilants jusqu'à la fermeture de la grappe.

MÉTÉO

Prévisions du 7 juillet au 11 juillet 2010 (Source : Météo France)

	-	Mer 7	Jeu 8	Ven 9	Sam 10	Dim 11
Températures	-	16 33	18 35	20 33	20 30	20 30
Tendances	-					

STADES PHENOLOGIQUES

	Gamay	Fer	Cab. franc	Chenin	Cab. sauv
Estaing - Entraygues - Marcillac	31	29 - 31	29	29	29
Millau	29	29	29	29	-

Rappel des stades :

29 : Baies de la taille d'un plomb

33 : Fermeture de la grappe

31 : Baies de la taille d'un pois

35 : Véraison

MILDIOU

• Situation au vignoble

Quelques nouvelles taches sur feuilles ont été observées sur le secteur d'Estaing.

Sur le vignoble, la situation sanitaire reste globalement saine.

• Données de la modélisation (Postes des Marcillac, Bruéjous, Valady)

Les pluies orageuses annoncées pour la semaine dernière n'ont pas eu lieu. Il n'y a donc pas eu de contaminations la semaine dernière. De ce fait, la pression a légèrement diminué. Et le risque qui était initialement qualifié de fort s'est plutôt limité à un risque moyen pour la période écoulée.

La pression devrait encore diminuer cette semaine. 20 mm seraient nécessaires pour que de nouvelles contaminations aient lieu.

Évaluation du risque : Le risque diminue et le pression devient moyenne. Un temps instable est prévu par Météo France pour la fin de la semaine. Selon l'importance des précipitations, celles-ci pourraient être contaminantes.

OÏDIUM

Évaluation du risque : Surveillez l'apparition des symptômes et soignez particulièrement l'observation des grappes et des feuilles au cœur des ceps. Jusqu'au stade fermeture, les grappes restent réceptives à de nouvelles attaques et la présence de taches sporulantes favorisent une évolution rapide de la maladie, d'autant plus si les conditions sont favorables (brumes ou brouillard matinaux notamment).

BLACK ROT

• Situation au vignoble

On note toujours une évolution des symptômes autour des foyers existants.

Évaluation du risque : Comme pour l'oïdium, la sensibilité de la grappe au black-rot est maximale entre la nouaison et le stade fermeture. En cas de présence de taches sur feuilles, la progression des symptômes sur grappes, à la faveur de nouvelles pluies, est toujours possible.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat de l'AOC Marcillac et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les recommandations issues de bulletins techniques.