

A retenir

MILDIU







La pression augmente et devient moyenne. Les premiers symptômes ont été observés. Soyez vigilants.







OÏDIUM

Des symptômes sont observés. Restez vigilants tant que le stade fermeture de grappe n'est pas atteint.

MÉTÉO

Prévisions du 21 au 26 juin 2011 (Prévisions Météo France)

Zone Corrèze	Mar 21	Mer 22	Jeu 23	Ven 24	Sam 25	Dim 26
Températures	11 26	12 21	10 19	8 19	10 21	11 25
Tendances	 Orages en soirée	 Pluvieux	 Averses éparses	 Faible risque de pluies		

Zone Hte Vienne	Mar 21	Mer 22	Jeu 23	Ven 24	Sam 25	Dim 26
Températures	13 26	13 20	9 18	9 20	9 20	12 30
Tendances	 Perturbation peu active	 Passages pluvieux en matinée	 Temps instable	 Risque pluvieux l'après-midi		

STADES PHENOLOGIQUES

	Pinot noir	Gamay	Cab. F.	Cab. S.	Merlot	Chard.	Sauv.
Verneuil sur Vienne	32	32	-	-	-	-	-
Corrèze	-	-	32	31	32	32	32

Rappel des stades :
29 : Grains de la taille d'un plomb

30 : Grains 3 – 4 mm
31 : Grains de la taille d'un pois

32 : Grains 5-6 mm
33 : Fermeture de la grappe

MILDIOU

• Situation au vignoble

La situation est globalement saine. Les premières taches de mildiou ont été signalées sur le secteur de Queyssac (parcelle référence et 2 parcelles flottantes).

• **Données de la modélisation** (Potentiel Système – IFV : Postes de Voutezac et Verneuil sur Vienne)

A Verneuil, aucune pluie n'a été enregistrée jusqu'au 17 juin inclus (aucune données disponibles à partir du 17 juin).

A Objat, 1,6 mm et 4,4 mm ont respectivement été enregistrés les 16 et 17 juin. Ces pluies n'ont engendré que des contaminations élites voire des repiquages.

La pression a augmenté mais reste faible sur les deux secteurs. Elle devrait devenir moyenne à la faveur des passages pluvieux prévus pour cette semaine.

Les petites pluies prévues engendreraient des contaminations élites. Néanmoins, il suffit d'un cumul de 15 à 20 mm pour engendrer des contaminations de masse à Objat et Verneuil.

Évaluation du risque : La tendance à la hausse de la pression se maintient. La pression épidémique devient moyenne sur les deux zones (Corrèze et Haute Vienne). La vigilance reste de mise, car des contaminations seraient possibles dès 15-20 mm cumulés.

Prophylaxie : Un épamprage soigné ainsi que l'élimination des rameaux situés près du sol permettent de limiter le risque de contaminations primaires. En effet, c'est souvent sur les organes verts se développant au ras du sol, qu'apparaissent les premiers foyers. Les contaminations successives se produisant alors par repiquage de ces premières taches.

OÏDIUM

• Situation au vignoble

La situation de la maladie sur grappes et sur feuilles est globalement saine.

L'oïdium n'est présent que de manière localisée, notamment sur le secteur de Allasac où la parcelle référence montrait déjà un début d'attaque sur feuilles les semaines précédentes. A ce jour, sur cette parcelle les dégâts sur grappes demeurent limités à 10 % des grappes présentant 1 à 2 grains oïdiés.

D'autres dégâts sur grappes ont été détectés sur une parcelle flottante du même secteur (fréquence d'attaque faible) ainsi que sur le secteur de Queyssac où deux parcelles sensibles sont concernées.

Évaluation du risque : Après le stade fermeture, les grappes sont beaucoup moins sensibles à de nouvelles contaminations. Mais si des symptômes sont déjà présents sur grappes, l'évolution de la maladie reste possible d'autant plus si les conditions sont favorables (brumes ou brouillard matinaux notamment).

Un contrôle **rigoureux et régulier** du niveau d'atteinte de vos parcelles s'impose à ce stade. Les contrôles visuels sont à faire sur au moins 50 grappes réparties sur une vingtaine de souches par parcelle.

Dans les parcelles indemnes et ayant atteint le stade fermeture de grappe : l'extériorisation de nouveaux symptômes est peu probable et ne devrait pas engendrer de dégâts significatifs sur la vendange.

Dans les parcelles présentant quelques symptômes sur grappes : la maladie peut progresser sur les baies à partir de symptômes déjà présents et le risque se maintient jusqu'à la véraison.

Pour toutes les situations plus tardives où le stade fermeture n'est pas atteint, le risque se maintient et une progression des symptômes est toujours possible. Maintenez votre vigilance.

Mesures prophylactiques : Le développement du champignon, notamment la sporulation, est perturbé par la lumière. En assurant l'aération et l'insolation des grappes, l'effeuillage peut permettre de limiter la progression de l'oïdium.

BLACK ROT

• Situation au vignoble

On observe ponctuellement quelques symptômes sur grappes qui restent sans incidence.

Évaluation du risque : La réceptivité des grappes à de nouvelles contaminations diminue significativement dès le stade fermeture de grappe.

BOTRYTIS

Le développement de la maladie va être influencé par les conditions météo mais aussi par la situation de la parcelle : sensibilité variétale, le type de sol, les pratiques culturales (ébourgeonnage, effeuillage...).

Évaluation du risque : Une surveillance spécifique du botrytis ne se justifie que pour les situations exposées à un risque moyen à fort : cépages sensibles, présence régulière de symptômes de botrytis.

THRIPS

• Situation au vignoble

Les populations de thrips sont toujours présentes mais le taux d'occupation mesuré lors des tournées de surveillance n'est pas alarmant et très en-dessous du seuil de nuisibilité.

Évaluation du risque : Surveillez vos parcelles à risque.

■ **Seuil de nuisibilité** : 60 % de feuilles occupées par une forme mobile

CICADELLE VERTE

• **Situation au vignoble** : Les premières larves ont été observées mais leur présence reste anecdotique.

FAUNE AUXILIAIRE

De nombreux auxiliaires ont été observés. Leur présence reste limitée mais mérite d'être signalée : coccinelles, œufs et larves de chrysopes, punaise orius. Les typhlodromes, quant à eux, se font encore discrets.

Le prochain BSV Vigne Limousin paraîtra le mardi 28 juin.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉ SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre Régionale d'Agriculture du Limousin, la Chambre Départementale d'Agriculture de Corrèze, la Cave Viticole de Branceilles (M.Perrinet) et le Syndicat Viticole du Vin Paillé de la Corrèze (M.Mage et M.Roche).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.