

BULLETIN TECHNIQUE

Légumes bio



Septembre
2009



Noctuelles des fruits sur tomate sous abris et plein champ :

Les larves de noctuelles (papillons gris pour les mâles, bruns pour les femelles) perforent les fruits provoquant leur maturité prématurée. C'est la période où l'on constate des dégâts, si vous avez régulièrement des pertes (perforation des tiges et des fruits), vous pouvez protéger vos cultures dès que vous observez les premiers symptômes (chenilles ou fruits percés) avec un produit à base de Bacillus: DELFIN DF, DIPEL DF, INSECTOBIOL. Attention le Novodor, spécifique de la lutte contre doryphore, n'est pas efficace pour lutter contre les noctuelles

Mouche de la carotte

Les pièges mis en place en Haute Garonne et dans le Tarn ne révèlent pas de vols de mouche. Étant donné la diversité pédo-climatique de la région Midi – Pyrénées, il est conseillé de couvrir les cultures pour les protéger.

Les températures élevées, les plantations tardives des premières cultures à cause des précipitations printanières sont peut-être responsables de l'absence de mouches.

L'ail pour production en vert

Pour favoriser une bonne levée de l'ail planté en septembre pour une production en vert au printemps, il est conseillé de mettre les caïeux à 7°C pendant une bonne dizaine de jours avant la plantation. 7°C est la température de levée de dormance de l'ail, c'est également la température d'un frigidaire ménager.

Contacts

Chambre d'Agriculture
du Tarn
Gérard ASSIE
Port. : 06. 84.63.97.08

Chambre d'Agriculture
Haute-Garonne
Laurence ESPAGNACQ
Port. : 06.74.05.27.49

Chambre d'Agriculture
des Hautes-Pyrénées
Thierry MASSIAS
Port. : 06.07.70.61.58



CHOUX

CONTRE LES CHENILLES

(NOCTUELLES, PIERIDES, TEIGNES...)

Il est important de contrôler les populations. Si présence, n'intervenir que sur les larves jeunes pour une meilleure efficacité avec DIPEL DF – INSECTOBIOL J.

CELERI RAVE

Ne pas hésiter à butter afin de diminuer le collet vert. Des plantations trop tardives sont souvent la cause du manque de grosseur des « boules ». Préférez des plantations en Mai. Juin est souvent trop tardif.

POIREAUX :

Ne pas hésiter à butter légèrement la culture afin d'accroître la partie blanche du fut . Attention, il sera léger pour éviter de mettre de la terre dans le cornet.